


※ 10월 21일 USDA 기후작황보고서(Volume 100, No. 41)

□ 미국 기후 현황(9/29~10/05)



때 이른 눈보라인 black hills가 몰아쳐 인근지역의 경우 돌풍을 동반한 눈보라가 몰아쳤으며, 가축들에게는 상당한 어려움을 야기하였다. 대평원에서 East Coast 지역에 이르기까지 야외작업은 중단되었으며, 많은 지역에 한랭전선으로 인한 많은 양의 비가 내렸다. 열대 폭풍우인 karen은 중부 걸프만에 이르기 전 10월 6일경에 소멸되었으나, 늦은 폭풍의 이동과 한랭전선의 영향으로 인해 많은 양의 강수량이 형성되어 이로 인해 수분이 형성되는 원인이 되었다. 또한, 한랭전선으로 인해 바람이 부는 기상조건은 중서부 지역 작물의 성숙도에 대한 염려를 하게 만들었다. 동부 콘벨트 지역과 북부 Mid-Atlantic 지역의 주간 기온은 평년대비 10°F 정도 높았으나 북서부 내륙의 경우 평년대비 적어도 5~10°F 정도 낮은 것으로 나타났다. Rockies 산맥 지역, 서부 Intermountain, 북부 고원 평야지대의 경우 주 후반 기온은 32°F 보다 살짝 낮은 수준이었다. 그러나 중서부 지역의 옥수수과 대두는 생장 말기의 동해로부터 해를 입지 않았으며, 숙기가 부족한 곡물에게는 생장에 필요한 추가적인 시간을 제공하는 계기가 되었다. 앞서 찾아온 온난함과는 반대로 서부지역에서는 겨울과 같은 서늘한 기온이 몇 일째 기록되었다. 차가운 기온은 북서부 겨울 밀의 출현과 성장을 지연시켰다. 찬 대기가 도착하기 전, 주 초반에는 태평양 북서부의 일부 지역에서는 9월 들어 가장 잦은 폭우를 기록한 것으로 나타난다.

* 주요 농작물의 현황과 기후 현황은 *Weekly Weather and Crop Bulletin* Volume 100, No. 42, 43을 참조해 주십시오.